Lista de exercícios sobre recorrências

Prof. João B. Oliveira

1. Dada a descrição abaixo para alguns valores de S_n , encontre uma maneira de representar S_n como recorrência:

$$S_1 = 1$$

$$S_2 = 2.1 + 2$$

$$S_3 = 2.2.1 + 2.2 + 3$$

$$S_4 = 2.2.2.1 + 2.2.2 + 2.3 + 4$$

$$S_5 = 2.2.2.2.1 + 2.2.2.2 + 2.2.3 + 2.4 + 5$$

$$S_n = ?$$

2. Resolva as seguintes recorrências:

$$(a) P(n) = \begin{cases} 13, & n = 1 \\ 30 - P(n-1), & n > 1 \end{cases}$$

$$(b) Q(n) = \begin{cases} 5, & n = 1 \\ 12, & n = 2 \\ 31 - Q(n-1) - Q(n-2), & n > 2 \end{cases}$$

3. Seja a definição abaixo para a função F , que serve para produzir strings:

$$F_n = \begin{cases} 'A', & n = 0 \\ 'B', & n = 1 \\ F_{n-1} + F_{n-2}, & n \geq 2, \end{cases}$$

onde o sinal $+$ representa a concatenação de strings. Pela definição, temos que $F_2 = BA$, $F_3 = BAB$, $F_4 = BABBA$ e assim por diante. A partir daí, resolva os itens a seguir.

- (a) Obtenha uma recorrência para L_n , que é o comprimento da string F_n .
- (b) Obtenha uma recorrência para A_n , que é o número de caracteres A de F_n .
- (c) Obtenha uma recorrência para B_n , que é o número de caracteres B de F_n .
- (d) Mostre que $L_n = A_n + B_n$ para todo n .
- (e) Altere os itens anteriores, supondo que a operação de concatenação agora é feita da seguinte maneira: $F_n = F_{n-1} +' C' + F_{n-2}$, ou seja, uma letra C sempre é intercalada entre as strings. Obtenha uma recorrência para C_n , que é o número de caracteres C em F_n .

- (f) Altere os itens anteriores, supondo que a operação de concatenação agora é feita da seguinte maneira: $F_n = F_{n-1} + 'C' + \text{Strip}(F_{n-2}, B)$, ou seja, uma letra C sempre é intercalada entre as strings e a função $\text{Strip}(S, X)$ retira todas as ocorrências de X em S .
- (g) Altere os itens anteriores, supondo que a operação de concatenação agora é feita da seguinte maneira: $F_n = \text{Strip}(F_{n-1}, A) + 'C' + \text{Strip}(F_{n-2}, B)$.
4. Você deve determinar o número $S(n, k)$ que representa quantas strings binárias de tamanho n podem ter k bits ligados. Você sabe que poderia resolver isso através de combinações de n dados k a k , mas resolveu adotar uma análise diferente: construa uma recorrência que determine $S(n, k)$. Não fique intimidado, pois não é difícil.
5. Ogivas nucleares são baseadas em um princípio muito simples: se você juntar um monte de urânio U_{235} e bombardeá-lo com nêutrons sob certas condições bastante especiais, os núcleos de urânio se romperão, liberando energia (cerca de 180 MeV por rompimento, pra ser exato) e disparando outros nêutrons (cerca de 2.52 nêutrons em média). Isso dá origem a uma **reação em cadeia** bastante desagradável, onde gerações e gerações de nêutrons são produzidos e muita energia é liberada (muita mesmo...). Sendo assim, resolva os seguintes problemas:
- (a) Modele o número de nêutrons a cada geração, se você fornece a nêutrons iniciais.
- (b) Modele a energia liberada a cada iteração, para a nêutrons iniciais.
- (c) Modele a energia total liberada até a n -ésima geração, em MeV. Sabendo que 2.62×10^{25} MeV são um quiloton, converta para quilotons.
- (d) Determine o efeito de ter um nêutron a mais no início do processo, para o total de energia liberada.
- (e) Determine o efeito de perder alguns nêutrons para o meio externo, e por isso o fator de multiplicação cai de 2.52 para apenas 2.
- (f) Uma ogiva de verdade realiza cerca de 80 gerações até ser destruída por sua própria energia. Determine quantos nêutrons são usados neste caso, e a energia total liberada.

6. Números triangulares

Veja as figuras abaixo, obtidas dividindo-se sucessivamente um triângulo equilátero cujo lado inicial é de comprimento unitário:

Usando recorrências, somatórios ou outras ferramentas à sua disposição, determine fórmulas fechadas para as seguintes quantidades:

- (a) T_n , o número de triângulos existentes na n -ésima iteração.
 - (b) L_n , o número de arestas existentes na n -ésima iteração.
 - (c) A_n , o número de arestas formando o lado de fora do triângulo na n -ésima iteração.
 - (d) E_n , o número de triângulos com arestas no lado de fora do triângulo na n -ésima iteração.
 - (e) Δ_n , o número de triângulos pequenos apontando para cima na n -ésima iteração.
 - (f) ∇_n , o número de triângulos pequenos apontando para baixo na n -ésima iteração.
 - (g) C_n , o comprimento total das linhas necessárias para traçar a n -ésima iteração.
 - (h) Mostre que a diferença entre Δ_n e ∇_n torna-se infinitamente grande à medida que n cresce. Mostre que apesar desta diferença cada vez maior existe essencialmente o mesmo número de triângulos para cima e para baixo à medida que n cresce.
 - (i) Apresente um algoritmo para desenhar a n -ésima iteração e calcule quanto tempo ele demora, se traçar uma reta custa 0.1 milionésimo de segundo. Calcule os tempos de desenho para as iterações 10, 15, 20, 25.
7. O presidente Beltrano começa a espalhar o boato de que aceita concorrer à reeleição. Ele conta a um funcionário do palácio, que sai contando para outras pessoas, e assim por diante. Quando uma pessoa escuta que ele quer concorrer Sim, ela passa a informação adiante mas tem uma probabilidade a de inverter a resposta e passá-la para Não. Se ela escuta Não, tem uma probabilidade b de passá-la adiante como Sim.
- (a) Suponha que $a = 1/4$ e $b = 1/3$. Interprete qual será a crença do eleitorado quando o boato for espalhado.

- (b) Suponha que $a = 0$ e $b = 1/2$. Interprete a mesma situação.
8. Há muito tempo atrás, as universidades admitiam apenas alunos homens (foi há **muito** tempo atrás). Nessa época, as tradições eram importantes, e o filho de um aluno de Oxford tinha 80% de chance de estudar em Oxford e os que sobrassem iam para Yale. Dos filhos de quem estudou em Yale, 40% deles eram aceitos em Yale e o resto se dividia entre Oxford e Cambridge. Já para quem estudou em Cambridge, seu filho tinha 70% de chance de voltar a Cambridge, 20% de chance de ir para Oxford e 10% de chance de ir parar em Yale.
- (a) Se nesses tempos primitivos havia apenas 10000 alunos universitários, quantos estudavam em Cambridge?
- (b) O que muda se a tradição de Oxford é tão forte que o filho de um “filho de Oxford” sempre vai para Oxford?
- (c) Modifique o problema para levar em conta o fato de que um homem só tem 80% de chance de ter um filho homem. Discuta a adequação deste modelo à realidade.